Состав пластыря:

- маллетия сетчатая,
- цистанхе солончаковая,
- дринария,
- циботиум,
- дудник крупнопиличатый,
- софлор,
- гинура перестонадрезная,
- хохлатка сомнительная,
- борнейская камфора.

Свойства пластыря:

- обезболивающее действие;
- улучшает кровообращение;
- снимает отечность, опухлость;
- улучшает обмен веществ.

Применяется при:

- Остеохондроз
- Радикулит
- Ишиас
- Ревматизм
- Артрит
- Артроз коленных суставов
- Боли в спине и в ногах
- Плечелопаточный и локтевой периартрит
- Растяжение мышц и связочного аппарата
- Ушибы
- Спортивные травмы
- Миозиты
- И другие заболевания позвоночника, грудной клетки и конечностей.

Способ применения:

- открыть упаковку по надрезу;
- достать пластырь;
- снять бумажную наклейку с одной стороны;
- наклеить липкой стороной на чистую поверхность кожи;
- пластырь использовать 2-3 дня;
- затем снять, поверхность кожи промыть. Через 3-5 часов процедуру можно повторить.

Дополнительные рекомендации по применению пластыря:

- При ортопедических проблемах позвоночника, лучший результат дает наложение двух пластырей одновременно: один в пояснично-крестцовой области, второй – в шейно-лопаточной области (в местах локализации боли).
- При воспалительном состоянии в позвонке или спине (ганглии) – пластырь наклеивается на болевое место или по обе стороны позвоночника.
- При ишиасе, пояснично-крестцовом радикулите – один пластырь наклеивается на крестцовую область, второй - на пяточную зону с внешней боковой стороны пятки.
- При болях в коленном суставе – наилучший эффект дает наложение двух пластырей одновременно с двух сторон колена.
- При локализации боли в местах проекции внутренних органов: печени, желчного пузыря, почек – рекомендовано наложение одного пластыря. Осторожно при наличии камней.
- При проблемах мочевого пузыря (цистит); при проблемах матки и яичников – лучший эффект дает наложение двух пластырей (один на животе, второй на крестце).
- При простудных явлениях: бронхиты, трахеиты – два пластыря – один на грудь, второй между лопатками, в зависимости от того, в каких долях легкого идет воспалительный процесс бронхов: верхних, средних, нижних.

Внимание! Запрещено использовать пластыри:

- на нижние конечности при варикозном расширении вен;
- на открытые раны;
- при аллергических реакциях на отдельные компоненты BANG DE LI.